



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Българска агенция по безопасност на храните

РАЗРЕШЕНИЕ

за пускане на пазара и употребата
на продукт за растителна защита

№ 01831 – ПРЗ*

Дата на издаване: 26.03.2020

Издание: 1/26.03.2020

**ТЪРГОВСКО
НАИМЕНОВАНИЕ:**

ФОСТОКСИН ТОРБИЧКА

Активно/и вещество/а:

алуминиев фосфид 570 г/кг

Производител/и:

Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Производител: Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Функция на продукта: инсектицид

Вид на формулацията: продукт отделящ газ (ГЕ)

Категория за употреба: първа професионална

**Размер и
материал на
опаковката:**

680 г опаковка - 20 торбички от полиетилен с висока плътност (т. нар. Тувек), всяка от които съдържа 34 г от продукта са опаковани в алуминиева торба. В един стоманен контейнер се съхраняват 30 алуминиеви торби. 3,4 кг опаковка - 100 торбички Тувек (всяка по 34 г) са опаковани в алуминиева торба. В един стоманен контейнер се съхраняват 6 алуминиеви торби.

**Притежател на разрешението за
пускане на пазара и употреба:**

Деция Фрайберг ГмбХ, Германия

Основание: чл.55 ал.2 от Закона за защита на растенията и Заповед №РД 11-735/19.03.2020 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за разрешаване за пускане на пазара и употреба на територията на страната на продукт за растителна защита.

Срок на валидност: 31.08.2023 г.

При последващо удължаване на одобрението на съдържащо се в продукта активно вещество, срокът на валидност на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФОСТОКСИН ТОРБИЧКА се удължава съгласно срока посочен в регламента за изпълнение на Комисията, с който одобрението на активното вещество е удължено и съгласно срока по чл.32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, при което не се издава нарочна заповед. При започнала процедура по подновяване на разрешението за пускане на пазара и употреба на продукта за растителна защита ФОСТОКСИН ТОРБИЧКА съгласно чл. 43 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 преди изтичане на срока на разрешението, срокът на валидност на разрешението се удължава до приключване на процедурата по подновяване на разрешението или до прекратяване на разрешението по реда на чл. 68 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) или отнемане на разрешението по реда на чл. 67 от ЗЗР.

* Продуктът за растителна защита се идентифицира с този номер на разрешението

Име на продукта
Формуляция

Концентрация на активно/и алюминий/ев фосфил 570-г/кг
вещество/а:

№	Култура и/или описание	П О или З	Вредител или група вредители, с които се води борба	Приложение					Доза на приложение			Карантинен срок (дни)	Забележки
				Метод Вид (f-h)	Фази на развитие и сезон (i)	Брой Мин/ макс (k)	Интервал между Приложения (мин)	л/мл или г/кг продукт /дка Мин/макс	Вода литра/дка	грама а.в./дка			
1.	(a) При Съхранение на - продукти от зърнено-житини култури, сушени плодове, сушени зеленчуци, варива – фасул, леща, грах, лупина, складиращи маслосеменни култури, ядки, преработени ядливи продукти, сушени подправки, чай, кафе, какао, рождови и сушени билки и тропици	(b) 3	(c) Житна гърица (<i>Sitophilus granarius</i>), оризова гърица (<i>Sitophilus oryzae</i>), фасулев зърнояд (<i>Acanthoscelides obtectus</i>), грахов зърнояд (<i>Bruchus pisorum</i>) царевична гърица (<i>Sitophilus zeamais</i>), суритамски брашнояд (<i>Oryzaephilus surinamensis</i>), малък брашен бръмбар (<i>Tribolium confusum</i>), зърнов бръмбар (ризоперта) (<i>Rhyzopertha dominica</i>), ръждив червен	Фумигация в затворени пространства	При съхранение	1	-	1 торбичка/ 1,11 м ³	-	грама а.в./дка	(l) -	Между 5-14 дневна експозиция	
				Фумигация в затворени пространства	Пред складиране	1	-	1 торбичка/ 1,11 м ³	-	(m) -			
2.	Празни помещения за преработка и съхранение на храни и фуражи	3		Фумигация в затворени пространства	Пред складиране	1	-	1 торбичка/ 1,11 м ³	-	-	-	Между 5-14 дневна експозиция	

3.	Зърно при транспорт корабен транспорт	зърнов бръмбар (<i>Cryptolestes ferrugineus</i>), троглодерма (<i>Trogoderma granarium</i>), зърнов молец (<i>Sitotroga cerealella</i>), молец по сушените плодове (<i>Plodia interpunctella</i>), сив брашнен молец (<i>Ephestia kuehniella</i>), потонев бръмбар (<i>Lasioderma serricorne</i>), потонев молец (<i>Ephestia elutella</i>), ръжживо червен брашнен бръмбар	Фуимигация в затворени пространства	По време на транспорт	1 торбичка/ 1,11 m ³	-	21 дневна експозиция
		3					

(a) За културите трябва да се използват класификациите на ЕС и Кодекс (и двете), където е уместно, трябва да се опише ситуацията на употреба (напр. фуимигация на една структура)

(b) Употреба на открито или на поле (1), приложение в оранжерия (2) или в закрито помещение (3)

(c) напр. ханшети/ризети или смучени насекоми, почвени насекоми, листни гъби, шевели

(d) напр. намокрял прах (НП), емулсионен концентрат (ЕК), гранули (ГР)

(e) GСРР Кодове – GНFAR-Техническа монография №2, 1989

(f) Всички използвани съращения трябва да бъдат обяснени

(g) метод, напр. разпръскване с висок обем, разпръскване с нисък обем, намазване, направяване, наморяване

(h) вид, напр. тилостно, разпръскване, въздушно пръскане, на реда, на отделно растение, между растенията – трябва да бъде указан типът оборудване

(i) g/kg или g/l

(j) етапий на развитие при последното третиране (ВВСН Монография. Стадий на развитие на растението, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), включително където е уместно, информация за сезона при приложението

(k) Посочете минималният и максимален брой възможни приложения съгласно практическите условия на употреба

(l) РНЦ – минимален интервал преди прибиране на реколтата

(m) Забележките могат да включват: степен на употреба/икономическо значение/реструкции

Класификация и етиктиране съгласно Регламент (ЕО) No 1272/2008 и Регламент (ЕО) 547/2011:

Класификация			Етиктиране		
Клас и категория на опасност	Код (ове) на предупреждението (ята) на опасност	Код (ове) на пиктограмата (ите) и сигнална (и) думи (и)	Код (ове) на предупреждението (ята) за опасност	Код (ове) на допълнителното (ите) предупреждение (я) за опасност	Специфични предпазни мерки за безопасност
Вещества или смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове, категория 1	H260 H300 H311 H330 H400	GHS02 GHS06 GHS09 Опасно	H260 H300 H311 H330 H400	EUN029 EUN032 EUN401	SP1 SPo 1
Остра токсичност орална, категория 2					
Остра токсичност дермална, категория 3					
Остра токсичност инхалаторна, категория 1					
Опасност за водната среда – остра опасност, категория 1					

Особени изисквания и/или ограничения: Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води). Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми и пътища. Да се използват лични предпазни средства – защитни ръкавици, защитно облекло (гащеризон) и оборудване за защита на дихателните пътища (полумаска най-малко EN 140 с комбиниран филтър най-малко EN14387 B2P3 или еквивалентен) при прилагане и повторно влизане в третираните зони, преди концентрацията на фосфин във въздуха да е под 0,01 ppm Срок на повторно влизане в третираните зони – след проветряване в продължение на 48 часа и концентрацията на фосфин във въздуха под 0,01 ppm При контакт с кожата, първо да се отстрани продуктът със суха кърпа и след това кожата да се измие обилно с вода. Да се прилага само от лица, които извършват специализирани растителнозащитни услуги: фумигация на растения, растителни продукти и други обекти и са вписани в Публичен национален електронен регистър на интернет страницата на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ПРОФ. Д-Р ПАСКАЛ ЖЕЛЯЗКОВ, ДВМ



На основание чл.6, ал.1 т. 1 и ал. 2 от Закона за защита на растенията Българската агенция по безопасност на храните поддържа и актуализира в електронната си страница : www.babh.government.bg база данни за пуснатите на пазара за употреба продукти за растителна защита.